


Thiencarbazone ilavesiyle güçlendirilmiş etki ve daha geniş etki spektrumu

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Dozu	İlaçlama Zamanı	
Buğday	Yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	25 gr / da + 100 ml Biopower*	Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde uygulanır. (2-6 gerçek yaprak)	
	Kuş otu (<i>Phalaris brachystachys</i>)			
	Yabani fiğ (<i>Vicia sativa</i>)			
	Şahrete (<i>Fumaria officinalis</i>)			
	Y.Başaklı kuş yemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)			
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)			
	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>)			
	Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>)			
	T.köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>)			
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)			
	Salkım otu (<i>Poa annua</i>)			30 gr / da + 100 ml Biopower*
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)			
	Delice (<i>Lolium temulentum</i>)			
	Hazeran (<i>Consolida regalis</i>)			
Gerçek papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)				
Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)				
Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>)				
Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>)				

(*) Biopower yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka Atlantis Star WG 21.15 ile birlikte kullanılmalıdır. Etiketinde tavsiye edilen uygulama dönemlerinde ve uygun iklim şartlarında kullanıldığında kültür bitkisinde herhangi bir olumsuzluğa sebep olmaz.

Buğdayda kullanım zamanı



Atlantis Star etiketinde tavsiye edilen dönemlerde ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda güvenle kullanılabilir. Geç dönem uygulaması (sapa kalkma ve sonrası) yapılması halinde makarnalık buğdaylarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye 34770 İSTANBUL
Tel: 0216 / 528 36 00 Fax: 0216 / 528 38 68

Bayer
TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.

Zehirlenme halinde başvurunuz.
Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114
Bütün Zırai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.



Yabancı Ot Kontrolünde Yeni Star

- Üçlü kombinasyon
- Daha güçlü etki
- Daha geniş etki spektrumu

Atlantis Star, Bayer Entegre Yabancı Ot Yönetimi Programının bir parçasıdır.



- ★ **Tek uygulama ile dar ve geniş yapraklı yabancı ot kontrolü**
- ★ **Üç aktif maddenin mükemmel uyumu ile daha yüksek etki ve daha geniş etki spektrumu**
- ★ **Çevreye saygılı, bitkiye güvenli, üreticiye dost**

Atlantis Star, buğday tarlalarında sorun olan yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkış sonrası kontrol eden yeni bir yabancı ot ilacıdır.

Atlantis Star, sistemik bir yabancı ot ilacı olup, yabancı otların yaprakları, kısmen de kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Atlantis Star uygulamasından sonra yabancı otların topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece yabancı otun buğday ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

Atlantis Star, entegre yabancı ot yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle ACCase'a (FOB) karşı direnç kazanmış yabancı yulaf, tilki kuyruğu gibi önemli dar yapraklı yabancı otlar ve Bucril MC ile direnç kazanmış yabancı hardalların mücadelesinde başarı ile kullanılabilir.

İkinci ürün ekiminde dikkat edilecek hususlar;

- Atlantis Star kullanılmış olan buğday tarlasına pamuk ve soya emniyetle ekilebilir
- Mısır, ikinci ürün olarak ya da kuruya ekilecek ise ekim öncesi derin sürüm yapılmalıdır.
- Atlantis Star kullanılan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.
- Diğer ürünler için mutlaka firmamıza danışınız.

Herbisit kullanımında dikkat edilecek noktalar;

- Aynı tarlada aynı herbisit veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir.
- Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe, yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

Daha ayrıntılı bilgiye www.yabanciotdirenci.com adresinden ulaşabilirsiniz

Önemli dar yapraklı yabancı otlar



Yabancı yulaf
(*Avena sterilis*)



Kuş otu
(*Phalaris brachystachys*)



Delice
(*Lolium temulentum*)



Tilki kuyruğu
(*Alopecurus myosuroides*)

Önemli geniş yapraklı yabancı otlar



T.köpek papatyası
(*Anthemis arvensis*)



Dilkanatan
(*Galium aparine*)



Şahtere
(*Fumaria officinalis*)



Kokarot
(*Bifora radians*)

Karışabilirlik Durumu:

Atlanti Star WG 21.15; organik fosforlu ilaçlar, yaprak gübreleri ve Puma Super ile karıştırılmaz. Input EC 460 ve Bucril MC ile karışabilir. Ancak Bucril MC ile karışımı buğday tarlalarının marul ve benzeri hassas sebze alanları, meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.