



Luna®
TRANQUILITY
SC 500

Rahat ol!

Luna Tranquility çözer!

*Karpuzda erken yaprak yanıklığı
hastalığına karşı güçlü çözüm!*



LUNA TRANQUILITY® SC 500

Karpuz üretiminde erken yaprak yanıklığı (*Alternaria cucumerina*) hastalığına karşı üstün performans sergileyen **Luna Tranquility® SC 500**, Fluopyram ve Pyrimethanil etken maddelerinin güçlü sinerjisine sahiptir. Bu sayede hastalığa karşı yalnızca yüksek koruyucu etki göstermekle kalmıyor, bitkiye yeni bulaşan hastalığın spor oluşumunu durdurarak ilerlemesini de önüyor.

- **Luna Tranquility® SC 500** kontak ve translaminar özelliklerinin yanında, bitki dokularında sistemik hareket edebilen bir fungusittir.
- Erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı hızlı etki gösterir ve karpuz üretiminde sağlıklı bir yaşam döngüsü sağlar.
- Biyolojik etkinliği yüksek olan **Luna Tranquility® SC 500**, aynı zamanda sıvı formülasyona sahiptir. Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılabilir ve meyvede leke bırakmaz.

LUNA TRANQUILITY® SC 500 KİLİT ÖZELLİKLERİ



GÜÇLÜ KORUMA

Fluopyram ve Pyrimethanil etken maddelerinin uyumu sayesinde uzun süreli güçlü koruma sağlar.



SAĞLIKLI GÖRÜNÜM

Bitkiye yeşil ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.



YÜKSEK VERİM

Yüksek kaliteli ve verimli karpuz üretimine destek olur.



UYGUN MALİYET

Uygun maliyetlidir ve hastalık mücadelesinde ek yük getirmez.



HASADA KADAR SAĞLIKLI MEYVE

Hasada kadar sağladığı etkin koruma ile hasatta yüksek verim almanıza yardımcı olur.

KARPUZDA ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI

İlk belirtilerin yaşlı yapraklarda ortaya çıktığı erken yaprak yanıklığı hastalığında (*Alternaria cucumerina*) lekeler başlangıçta açık yeşil veya sarı haleli şekildedir. Hastalık ilerledikçe konsantrik görümlü kahverengi nekrotik alanlar oluşur. Daha sonra lekeler birleşerek yaprak yüzeyini kaplar ve yaprakların ölmesine sebep olur. Güneşten zarar gören karpuz meyvelerinin ise kalitesi ve veriminde düşüşler meydana gelebilir.



LUNA TRANQUILITY® SC 500 İLE NE KAZANACAKSINIZ?

- Karpuzda erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı sağladığı **üstün koruma ile sağlıklı ürün** elde edersiniz.
- Karpuzun en hassas olduğu **kol atma ve çiçeklenme döneminde**, üstün etkisiyle karpuzunuzu korur ve sağlıklı gelişim ortamı sağlarsınız.
- Erken dönemde hastalığı kontrol ederek, **kademeli meyve oluşumunu engeller**, tonaj ve kalite kaybını önlersiniz!
- Biyolojik etkinliğinin yüksekliği sayesinde **hasat sonrası ürünlerinizin raf ömrüne olumlu etki** eder.
- Sıvı SC formülasyonu sayesinde **leke bırakmaz** ve uygulama döneminde kullanılan diğer ürünlerle karışmada problem yaratmaz.



LUNA TRANQUILITY® İLE KARPUZLAR DAHA SAĞLIKLI ALTERNARIA HASTALIĞINA KARŞI GÜÇLÜ YARDIMCI

Ürün Grubu : Fungisit
Etkili Madde : 375 g/L Pyrimethanil + 125 g/L Fluopyram
Formülasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera)	Sebzelerde Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml / 100 L su	3 gün
Biber (sera)			
Patlıcan (sera)			
Hıyar (sera)	Sebzelerde Beyaz Çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	75 ml / 100 L su	3 gün
Kornişon (sera)			
Marul (tarla)	Sebzelerde Beyaz Çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	100 ml/da	3 gün
Soğan-Sarımsak	Soğan-Sarımsak Pas Hastalığı (<i>Puccinia porri</i>)	100 ml/da	7 gün
Çilek	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/da	3 gün
Çilek	Külleleme (<i>Sphaerotheca macularis</i> fsp. <i>fragariae</i>)	100 ml/da	3 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 ml / 100 L su	14 gün
Karpuz (tarla)	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	75 ml/da	14 gün



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.



KARPUZDA KULLANIM ŞEKLİ VE UYGULAMA

Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 36 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.cropscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.

