



**ÇELTİKTE YABANCI OT  
MÜCADELESİNDE  
BAŞARININ SIRRI  
COUNCIL® SC 300**

**COUNCIL®**  
SC 300



*Dirençli darıcan, kız otu,  
baraj otu ve biber otuna  
karşı güçlü etki*

*Yüksek verimli,  
kaliteli ve sürdürülebilir  
çeltik üretimi*

*Bayer yabancı ot  
uzmanlığını yansıtan yeni ve  
modern etki mekanizması*

*İşçilik,  
zaman ve maliyet  
tasarrufu*



## COUNCIL® SC 300

Çeltik tarlalarında yıllar içinde direnç kazanan darıcan, kız otu, baraj otu ve biber otu gibi yabancı otlarla mücadelede beklediğiniz çözüm sizlerle! Bayer'in yabancı ot çözümleri konusundaki uzmanlığını yansıtan **Council® SC 300**, kontrolü zor yabancı otlara karşı güçlü etki gösterir. İşçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlarken, hasatta verim ve kaliteyi zirveye taşır!

### ÜSTÜN ETKİ ŞEKLİ

- **Council® SC 300**, Tefuryltrione ve Triafamone isimli iki yeni aktif madde ve farklı etki mekanizmasına sahiptir. Çeltik ekiminden sonra, iki uygulama şeklinde kullanıldığında uzun süre yabancı ot kontrolü sağlar.

- Çeltik üretimini severek yapan, ileri teknolojileri takip eden ve akıllı yabancı ot çözümü arayanlar için geliştirilmiş modern bir herbisittir.

- Yabancı otlara karşı güçlü etkisi sayesinde sürdürülebilir çeltik üretiminin kapılarını açar, üreticilerin daha fazla kazanç elde etmelerine olanak sağlar.

### COUNCIL® SC 300 KİLİT ÖZELLİKLERİ



#### EŞSİZ DENEYİM

Bayer yabancı ot uzmanlığını yansıtan iki yeni etki mekanizmasına sahiptir.



#### DİRENÇ KIRICI

Dirençli darıcan, kız otu, baraj otu ve biber otuna karşı güçlü etki gösterir.



#### SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Yüksek verimli, kaliteli ve sürdürülebilir çeltik üretim imkanı sunar.



#### UYGUN MALİYET

İşçilik, zaman ve girdi maliyetlerinden tasarruf sağlar.



#### ÇEVREYE SAYGI

Çevreye, uygulayan kişiye ve bitkiye karşı son derece güvenlidir.



## HANGİ YABANCI OTLARA KARŞI ETKİLİ?



**Darıcan**  
(*Echinochloa crus-galli*)



**Baraj otu**  
(*Diplachne fusca*)



**Kız otu**  
(*Cyperus difformis*)



**Boğumlu çobandeğneği**  
(*Polygonum lapathifolium*)



## COUNCIL® SC 300 İLE NE KAZANACAKSINIZ?

- Çeltik tarlalarında kontrolü zor dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı **başarılı sonuç** elde edersiniz.
- **Uzun süreli etkisiyle** güçlü yabancı ot kontrolü sağlarsınız.
- **Entegre yabancı ot** yönetimine uyumlu, çevreye ve bitkiye karşı güvenlidir.
- İşçilik ve zamandan tasarruf sağlayarak **daha fazla kazanç elde edersiniz.**
- Mevcut çeltik herbisitlerinin hiçbirleriyle **çapraz direnç göstermez.**

# ÇELTİKTE YABANCI OTLARIN DİRENCİNİ KIRAN TEKNOLOJİ

**Ürün Grubu** : Herbisit  
**Etkili Madde** : Tefuryltrione 200 g/l + Triafamone 100 g/l  
**Formülasyon** : SC (Süspansiyon konsantre)

## KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve zamanı
Çeltik	Kız otu ( <i>Cyperus difformis</i> )	Birinci uygulama 40 ml/da, çeltik ekiminden 7-10 gün sonra, çeltiğin ve yabancı otların 1-3 yapraklı döneminde İkinci uygulama 40 ml/da, birinci uygulamadan 7 gün sonra
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Baraj otu ( <i>Leptochloa fusca</i> )	Birinci uygulama 50 ml/da, çeltik ekiminden 7-10 gün sonra, çeltiğin ve yabancı otların 1-3 yapraklı döneminde İkinci uygulama 50 ml/da, birinci uygulamadan 7 gün sonra
	Boğumlu çobandeğneği ( <i>Polygonum lapathifolium</i> )	



### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde kalibrasyon yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde birim alana düşen su miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.



### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviyeli olması önemlidir.

- **Birinci uygulama:** Ekimden 7-10 gün sonra tavalardaki su boşaltılmalı, 1-2 gün sonra da ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamadan 1 gün sonra tavalara su verilmelidir.
- **İkinci uygulama:** Birinci uygulamadan 7-10 gün sonra (ekimden 14-20 gün sonra), aynı şekilde tavalardaki su boşaltılmalı ve 1-2 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamadan 1 gün sonra tavalara tekrar su verilmelidir.



### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Council® SC 300, etki mekanizmasına göre F2:B2 grubunda yer alan bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin tekrarlayan uygulamaları, direnci gelişimi teşvik etmektedir. Bu nedenle direnci gelişimini geciktirmek için Council® SC 300'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2:B2 harici) bir herbisit kullanılmasına özen gösteriniz.



### KARIŞILIRLIK DURUMU

Direnci yönetimi açısından bazı çeltik herbisitleri ile tank karışımı şeklinde kullanılabilir. Bu karışımları yapmadan önce bir Bayer yetkilisine danışınız.

**Uyarı:** Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.



**Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük**  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53  
Ümraniye 34770 İSTANBUL  
Telefon : 0216 / 528 36 00  
Faks : 0216 / 528 38 68  
[www.cropscience.bayer.com.tr](http://www.cropscience.bayer.com.tr)

Zehirlenme halinde başvurunuz.

**Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114**

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

**Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.**

